

2008年4月11日

命題とは、式や文章で表された事柄で、正しい(真)か正しくない(偽)が明確に定まるもの。

文字(x など)を含んだ命題で、 x の値によって真偽が変わるものを(x に関する)条件という。

- 条件 p の否定を \bar{p} と書く。明らかに $\bar{\bar{p}} = p$
- $p \wedge q$ (“ p and q ,” “ p かつ q ” とも書く)
- $p \vee q$ (“ p or q ,” “ p または q ” とも書く)
- $(\bar{p} \vee q)$ を $(p \implies q)$ と書く。
- $((p \implies q) \wedge (q \implies p))$ を $p \iff q$ と書く。
- $p \implies q$ が成り立つとき p を q の十分条件、 q を p の必要条件という。
- $\overline{p \wedge q} = \bar{p} \vee \bar{q}$
- $\overline{p \vee q} = \bar{p} \wedge \bar{q}$
- $(p \implies q) = (\bar{q} \implies \bar{p})$ (対偶)
- $p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

次の命題

すべての実数 x に対し、 $x^2 \geq 0$ である

は、無限個の命題を \wedge で結んだものと考えられる。一般に、 $p(x)$ を x に関する条件とすると、

$$\forall x, p(x)$$

によって、想定されるすべての x について $p(x)$ が真である、ということを表す。例えば

$$\forall x : \text{実数}, x^2 - x + 1 > 0$$

は真であるが、

$$\forall x : \text{実数}, x^2 - x - 1 > 0$$

は偽である。一方、

$$\exists x, p(x)$$

によって、想定されるどれかの x について $p(x)$ が真である、ということを表す。「 $p(x)$ を満たす x が存在する」または「ある x に対して $p(x)$ が成り立つ」と読む。例えば

$$\exists x : \text{実数}, x^2 - x - 1 > 0$$

は真であり、

$$\exists x : \text{実数}, x^2 - x - 1 \leq 0$$

も真である。

- $(\overline{\forall x, p(x)}) = (\exists x, \overline{p(x)})$
- $\forall n : \text{正整数}, \frac{1}{n} \leq 1$
- $\exists n_0 : \text{正整数}, (\forall n : \text{正整数で } n > n_0, \frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{1000})$

極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ の定義は

$$\forall \varepsilon > 0, (\exists n_0 : \text{正整数}, (\forall n : \text{正整数で } n > n_0, |a_n - a| < \varepsilon))$$

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ を \mathbb{R}^n のベクトルとする。これらが一次独立とは

$$\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{a}_i = 0 \text{ となるのは } (c_1, c_2, \dots, c_k) = (0, 0, \dots, 0) \text{ のときに限る}$$

が成り立つときをいう。これを論理記号 $\forall, \exists, \wedge, \vee$ などを用いて書き直してみよ。また一次独立でない（一次従属という）という条件をこれらの記号で書き表してみよ。

定理 1. A を $m \times n$ 行列とする。このとき、 $\text{rank } A$ は、 A の小行列のうちその行列式が 0 でないようなものの最大次数に等しい。

この定理を論理記号を用いて書き表してみよ。