

2010年5月25日

$A, B$  を有限集合とし、 $|A| = k, |B| = n$  とする。 $A$  から  $B$  への単射全体の集合を  $X$  とすると、

$$|X| = n(n-1)\cdots(n-k+1)$$

となる。これは  $n$  個から  $k$  個とる順列のことである。特に、 $k = n$  のとき、単射は必ず全単射となり、その個数は  $n!$  となる。一般に有限集合  $A$  から  $A$  への全単射を置換という。

$k$  を  $0 \leq k \leq n$  を満たす整数とすると、

$$\binom{B}{k} = \{X \mid X \subset B, |X| = k\}.$$

と定義する。このとき、

$$\left| \binom{B}{k} \right| = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k(k-1)\cdots 1}$$

であり、これを

$$\binom{n}{k}$$

と書く。

$X$  を  $n$  人からなる集合とし、 $X$  に属するどの2人についても、彼らが互いに知人であるかそうでないか明確に定まっているとする。 $n \geq 6$  のとき、次のいずれかが成り立つ。

- (1)  $X$  の中に、互いに知人どうしの3人が存在する。
- (2)  $X$  の中に、互いに知人でない3人が存在する。

この問題を記号で表すと、

$$F = \{T \mid T \in \binom{X}{3}, (\forall x \in T, \forall y \in T, (x \neq y \implies x \text{ と } y \text{ は知人}))\},$$
$$F' = \{T \mid T \in \binom{X}{3}, (\forall x \in T, \forall y \in T, (x \neq y \implies x \text{ と } y \text{ は知人でない}))\}$$

とおき、

$$F \cup F' \neq \emptyset$$

を示すことと同値である。言い換えると、 $F \cup F'$  の補集合を

$$G = \{T \mid T \in \binom{X}{3}, T \notin F \cup F'\}$$

とおいたとき

$$|G| < \binom{n}{3}$$

を示すことと同値である。そのために

$$S = \{(x, T) \mid (x, T) \in X \times G, x \in T,$$

$$T - \{x\} \text{ は } x \text{ の知人と } x \text{ の知人でない人からなる}\} \subset X \times G$$

の元の個数を2通りに数える。ここで、2通りに数えるというのは、 $S \subset X \times G$  のとき、

$$\begin{aligned} |S| &= \sum_{x \in X} |\{T \mid T \in G, (x, T) \in S\}| \\ &= \sum_{T \in G} |\{x \mid x \in G, (x, T) \in S\}| \end{aligned}$$

を使うということである。

このような問題を定式化するために、「関係」という概念を導入する。 $X$  を集合とし、 $X \times X$  の部分集合を  $X$  の上の関係という。

関係を図で表したものがグラフ (または、関係そのものをグラフということもある)。

以下の3つの条件を満たす関係  $R \subset X \times X$  を  $X$  上の同値関係という。

反射律  $\forall a \in X, (a, a) \in R$

対称律  $\forall a, b \in X, (a, b) \in R \implies (b, a) \in R$

推移律  $\forall a, b, c \in X, (a, b) \in R, (b, c) \in R \implies (a, c) \in R$

$(a, b) \in R$  のとき、 $a \sim b$  などと書くこともある。

同値関係の例：通常の数、元の個数が同じ集合、図形の合同、図形の相似、整数の合同。

$R \subset X \times X$  を  $X$  上の関係で、反射律、対称律をみたすとする。このとき、 $R \subset \tilde{R} \subset X \times X$  なる関係  $\tilde{R}$  で推移律をみたす最小の  $\tilde{R}$  を、 $R$  の推移閉包 (transitive closure) とよぶ。すなわち

$$\begin{aligned} \tilde{R} &= \{(a, b) \in X \times X \mid \exists n \in \mathbb{N}, \exists a_1, a_2, \dots, a_n \in X, (a, a_1), (a_1, a_2), \dots, (a_n, b) \in R\} \\ &\cup R. \end{aligned}$$

反射律、推移律に加えて以下の条件を満たす関係  $R \subset X \times X$  を  $X$  上の順序関係といい、 $(X, R)$  を半順序集合という。

反対称律  $\forall a, b \in X, (a, b) \in R, (b, a) \in R \implies a = b$

$(a, b) \in R$  のとき、 $a \preceq b$  などと書くこともある。

順序関係の例：通常の数、元の個数の大小、集合の包含、部分列、自然数の整除。

さらに、

$$\forall a, b \in X, ((a, b) \in R \text{ or } (b, a) \in R)$$

が成り立つとき、 $(X, R)$  を全順序集合という。